

Pflanzenschutzstrategie Feuerbrand Kanton ZH: Mittelwahl nach Phänologie (IP)

(Stand 6. April 2020)

												
A	B	C	C3	D	E	E2	F	F2	G	H	I	J
BBCH00	BBCH51	BBCH53	BBCH54	BBCH56	BBCH57	BBCH59	BBCH61	BBCH65	BBCH67	BBCH69	BBCH71	BBCH74
Einsatz <u>eines</u> der beiden Pflanzenstärkungsmittel bei jeder Schorf-Behandlung. Einsatz durchgehend gemäss Zulassung.				Bion								
				Vacciplant								
In Hochrisikoregionen erste Behandlung zur Hemmung der Bakterienentwicklung ab ersten offenen Blüten in der Anlage. (unabhängig von Infektionsprognose)							Myco-Sin					
Wenn möglich bei berostungsanfälligen Sorten (Golden Delicious, ...) eher in erster Blühphase einsetzen (max. 2x). Bei übrigen Sorte 3 x möglich.								BlossomProtect + BufferProtect				
Sofern Einsatz BlossomProtect + BufferProtect wegen Schorfstrategie problematisch: LMA einsetzen. Bei Birnen LMA generell bevorzugen.								LMA (Blüte)	LMA (nach Hagel)			

Pflanzenschutzstrategie Feuerbrand Kanton ZH: Mittelwahl nach Phänologie (Bio)

(Stand 6. April 2020)

												
A	B	C	C3	D	E	E2	F	F2	G	H	I	J
BBCH00	BBCH51	BBCH53	BBCH54	BBCH56	BBCH57	BBCH59	BBCH61	BBCH65	BBCH67	BBCH69	BBCH71	BBCH74
Einsatz bei jeder Behandlung durchgehend gemäss Zulassung und Empfehlung Hersteller.				Vacciplant								
In Hochrisikoregionen erste Behandlung zur Hemmung der Bakterienentwicklung ab ersten offenen Blüten in der Anlage. (unabhängig von Infektionsprognose)						Myco-Sin						
Wenn möglich bei berostungsanfälligen Sorten (Santana, ...) eher in erster Blühphase einsetzen (max. 2 x). Bei übrigen Sorte 3 x möglich.							BlossomProtect + BufferProtect					
Bedingung: schriftliche Versuchsbewilligung des FiBL (Praxisversuch) Details unter: http://www.betriebsmittelliste.ch/de/betriebsmittel/praxisversuche.html							LMA (Blüte)		LMA (nach Hagel)			