

Pflanzenschutzmittel gegen Feuerbrand nach phänologischen Stadien

(Stand 06. April 2020)

												
A	B	C	C3	D	E	E2	F	F2	G	H	I	J
BBCH00	BBCH51	BBCH53	BBCH54	BBCH56	BBCH57	BBCH59	BBCH61	BBCH65	BBCH67	BBCH69	BBCH71	BBCH74
				Bion (IP)								
				Vacciplant (IP/Bio)								
						Myco-Sin (IP/Bio)						
							BlossomProtect + BufferProtect (IP/Bio)					
							Serenade Max (IP/Bio)					
							LMA (Blüte) (IP/Bio*)			LMA (nach Hagel)		
										Regalis (IP)		

* Einsatz nur auf Teilflächen mit Versuchsbewilligung des FiBL → <http://www.betriebsmittelliste.ch/de/betriebsmittel/praxisversuche.html>

Präparat (Wirkstoff)	Wirkungsweise	Anwendungshinweise	Aufwandmenge bei 10'000m ³ Baumvolumen/ha
Bion (Acibenzolar-S-Methyl)	Pflanzenstärkungsmittel	Vorbeugender Einsatz. Aktiviert die natürlichen Abwehrmechanismen der Pflanze. Applikation ab BBCH56, alle 7 bis 14 Tage	20g vor Blüte 40g während Blüte 20g nach Blüte
Vacciplant (Laminarin)	Pflanzenstimulator	Vorbeugender Einsatz. Aktiviert die natürlichen Abwehrmechanismen der Pflanze. Applikation ab BBCH56, alle 5 bis 10 Tage	0.75 l
Myco-Sin (Schwefelsaure Tonerde = Aluminiumsulfat)	Teilwirkung gegen Blütenbefall	Rein präventiver Einsatz zum Schutz der Blüten und zur Stärkung der Resistenzeigenschaft der Pflanze. Applikation ab BBCH59, alle 5 bis 7 Tage	8 kg
Blossom Protect (Aureobasidium pullulans) + BufferProtect	Teilwirkung gegen Blütenbefall	Behandlung während Blüte. Behandlung am Vortag einer möglichen Blüteninfektion. Feuerbrandprognose beachten.	1.5 kg BlossomProtect + 10.5 kg BufferProtect
Serenade Max (Bacillus subtilis)	Teilwirkung gegen Blütenbefall	Behandlungen ab Blühbeginn alle 5 Tage. Muss vorbeugend eingesetzt werden. Feuerbrandprognose beachten.	5 kg
LMA (Kaliumaluminiumsulfat)	Teilwirkung gegen Blütenbefall	Behandlungen: - während der Blüte (max. 3x) - nach Hagelschlag (max. 1x). Feuerbrandprognose beachten.	20 kg
Regalis (Prohexadione-Calcium)	Teilwirkung gegen Sekundärinfektionen	Muss vorbeugend eingesetzt werden.	max. 2.5kg/Jahr Split-Behandlung empfohlen (zweimal 0.5 - 1.5kg/ha)

- Für detaillierte Anwendungshinweise und Einsatzzeitpunkte sind die Produkthinweise der Hersteller zu beachten!
- Aktuelle Wirkstofflisten-Listen (SAIO und Bio) beachten!